

Korn		Prothioconazol 250 g/l		Epoxiconazol 125 g/l		Tebuconazol 200 g/l		Propiconazol 250 g/l		Metrafenon 300 g/l		Proquinazid 200 g/l		Pyraclostrobin 200 g/l		Folpet 500 g/l		Boscalid 233 g/l (SDHI) Epoxiconazol 67 g/l		Boscalid 140 g/l (SDHI) Epoxiconazol 50 g/l Pyraclostrobin 60 g/l		Metrafenon 100 g/l Epoxiconazol 83 g/l		Tebuconazol 125 g/l Prothioconazol 125 g/l		Tebuconazol 160 g/l Prothioconazol 80 g/l		Tebuconazol 80 g/l Prothioconazol 160 g/l		Metconazol 41,25 g/l Epoxiconazol 56,25 g/l		Difenoconazol 150 g/l Propiconazol 150 g/l		Prothioconazol 125 g/l Fluopyram 125 g/l (SDHI)		Prothioconazol 160 g/l Spirooxamin 300 g/l (SDHI)	
Effekt af Fungicider 2017		Proline EC 250		Rubric		Orlus 200EW		Bumper 25 EC		Flexity		Tallus		Comet Pro		Folpan 500 SC		Bell		Viverda		Ceando		Posaro EC 250		Folicur Expert		Proline Xpert		Osiris Star		Armure		PROFULSE		Input EC 460	
kg-l/ha		0,40	0,20	0,40	0,20	0,50	0,25	0,40	0,20	0,20	0,15	0,25	0,75	0,60	0,30	0,70	0,35	0,40	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,55	0,28	0,40	0,50	0,50						
Forbrug af "triazol-kvot" i %		Max 100 %/sæson		0%	0%	40%	20%	40%	20%	40%	20%	0%	0%	0%	32%	16%	28%	14%	27%	20%	10%	26%	13%	13%	6%	25%	12%	50%	0%	0%							
Hvede		----- Må kun anvendes max 2 gange pr vækstsæson -----										*2 obs resistens risiko										-- max 2 gange -										*2		max 1			
Erysiphe graminis	Meldug forebyggende	**(*)	**	(*)		**	*	*		**(*)	**(*)		(*)	*		*		**(*)	**(*)	*	**(*)	*	**(*)	*	**(*)	*	*	*	*	*	*	**	**				
Erysiphe graminis	Meldug kurativ	**				*				*	**							*	*	(*)	*	(*)	*	(*)	*						**	**					
Puccinia striiformis	Gulrust	**	*(*)	***	**	***	**	**	*			**	(*)	***	**	***(*)	**	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***				
Puccinia recondita	Brunrust	**	*(*)	***	**	***	**	**	*			**	(*)	***	**	***	**	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***				
Septoria tritici	Gråplet	**(*)	**	**	*	*		*					*	***	**	***	**	*	**	*	*(*)	*	**(*)	*	**	*	**	*	*(*)	***	***						
Septoria nodorum	Brunplet	**(*)	**	**	*			*					*	***	**	***	**	*	**	*	*(*)	*	**(*)	*	*	*	*	*	*(*)	***	***						
Drechslera tritici-repentis	Bladplet DTR	***	**					***	**					*		*			*	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	**	***	***					
Fusarium Spp.	Fusarium	**	*			(*)													*(*)	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	**	**						
Pseudocercospora herpotrichoides	Knækefodsyge	*								**				*		*		*					*						*	*							
	Byg																																				
Erysiphe graminis	Bygmeldug	***	**	**	*			**	*	****	X	X	*	*		*(*)		***	**(*)	*	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***				
Drechslera teres	Bygbladplet	**	*	*(*)	*	*(*)	(*)	*	(*)		X	X		**(*)	**	***(*)	**	**	*(*)	*	*(*)	*	**	*	**	*	**	*	**	**	**	**					
Puccinia hordei	Bygrust	***	**	***	**	***	**	**	*		X	X	***	*	***	**	***(*)	**	***	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***	**	***					
Ramularia collo-cygni	Ramularia	***	**	***	**						X	X		***	**	***(*)	**	**(*)	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
Rhynchosporium secalis	Skoldplet	***	**	***	**	*(*)	(*)	**	*		X	X	**(*)	**(*)	*(*)	***	**	**(*)	***	*	***	*	***	*	***	*	***	*	*(*)	***	***						
Kr/ha pr behandling		195	97	156	78	86	43	76	38	154	#####	88	122	264	132	287	144	176	139	69	118	59	164	82	173	87	182	-	-								
Kr/kg/l 2016 listepris		487		390		172		190		772		?	352	162	440		410		441		347		295		410		315		456								

**** = 90-100 % effekt, *** = 75-90 % effekt, ** = 50-75 % effekt, * < 50 % effekt

*1: anbefales af hensyn til risiko for resistens kun 1 gang metrafenon pr sæson

*2: anbefales af hensyn til risiko for resistens kun 2 gange epoxiconazol pr sæson

d. 14. marts 2017 Jørgen Ewald Jensen
planterådgiver
mail@agriconsult.dk